

LE SAVIEZ VOUS?

TESTEZ VOS CONNAISSANCES SUR LE VIH / SIDA

 **COIFFEURS CONTRE LE SIDA**

 **L'ORÉAL FONDATION**
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

LE SAVIEZ VOUS?

TESTEZ VOS CONNAISSANCES SUR LE VIH / SIDA

Les coiffeurs acteurs de la prévention

Entourez la bonne réponse.

- 1** **VIH SIGNIFIE VIRUS DE L'IMMUNODÉFICIENCE HUMAINE.**
Vrai / Faux / Ne sait pas
- 2** **IL Y A UNE DIFFÉRENCE ENTRE LE VIH ET LE SIDA.**
Vrai / Faux / Ne sait pas
- 3** **UNE PERSONNE INFECTÉE PAR LE VIH EST DITE SÉROPOSITIVE.**
Vrai / Faux / Ne sait pas
- 4** **IL N'Y A QU'UN SEUL MODE DE TRANSMISSION DU VIH.**
Vrai / Faux / Ne sait pas
- 5** **ON PEUT ÊTRE CONTAMINÉ PAR LE VIH EN AYANT UN RAPPORT SEXUEL NON PROTÉGÉ PAR UN PRÉSERVATIF AVEC UNE PERSONNE SÉROPOSITIVE.**
Vrai / Faux / Ne sait pas
- 6** **ON PEUT ÊTRE CONTAMINÉ PAR LE VIH EN EMBRASSANT UNE PERSONNE SÉROPOSITIVE.**
Vrai / Faux / Ne sait pas
- 7** **ON PEUT ÊTRE CONTAMINÉ PAR LE VIH EN ÉTANT PIQUÉ PAR UN MOUSTIQUE.**
Vrai / Faux / Ne sait pas
- 8** **ON PEUT ÊTRE CONTAMINÉ PAR LE VIH EN RÉUTILISANT DES OBJETS BLESSANTS (AIGUILLES, LAMES DE RASOIR, ETC.) SOUILLÉS PAR LE SANG D'UNE PERSONNE SÉROPOSITIVE.**
Vrai / Faux / Ne sait pas
- 9** **ON PEUT ÊTRE CONTAMINÉ EN TRAVAILLANT À CÔTÉ D'UNE PERSONNE ATTEINTE DU VIH OU EN LA TOUCHANT.**
Vrai / Faux / Ne sait pas
- 10** **LE VIH PEUT SE TRANSMETTRE D'UNE MÈRE INFECTÉE À SON ENFANT PENDANT LA GROSSESSE, L'ACCOUCHEMENT OU L'ALLAITEMENT AU SEIN.**
Vrai / Faux / Ne sait pas
- 11** **L'UTILISATION DE PRÉSERVATIFS PENDANT UN RAPPORT SEXUEL PROTÈGE CONTRE LE RISQUE D'ÊTRE CONTAMINÉ PAR LE VIH.**
Vrai / Faux / Ne sait pas
- 12** **IL N'EXISTE PAS DE PRÉSERVATIF FÉMININ.**
Vrai / Faux / Ne sait pas
- 13** **LE TEST DE DÉPISTAGE DU VIH EST LE SEUL MOYEN DE SAVOIR SI L'ON EST SÉROPOSITIF OU NON.**
Vrai / Faux / Ne sait pas
- 14** **UNE SIMPLE PRISE DE SANG SUFFIT POUR FAIRE UN TEST DE DÉPISTAGE.**
Vrai / Faux / Ne sait pas
- 15** **LES PERSONNES QUI SONT SÉROPOSITIVES OU DÉJÀ MALADES DU SIDA PEUVENT ÊTRE GUÉRIES EN PRENANT LES TRAITEMENTS ACTUELLEMENT DISPONIBLES.**
Vrai / Faux / Ne sait pas
- 16** **ON PEUT RÉDUIRE LE RISQUE DE TRANSMISSION DU VIH, D'UNE MÈRE INFECTÉE À SON ENFANT PENDANT LA GROSSESSE, AVEC UN TRAITEMENT SPÉCIFIQUE.**
Vrai / Faux / Ne sait pas
- 17** **UNE PERSONNE SÉROPOSITIVE QUI SUIT UN TRAITEMENT NE PEUT PAS TRANSMETTRE LE VIH À UNE AUTRE PERSONNE.**
Vrai / Faux / Ne sait pas
- 18** **ON PEUT COIFFER UNE PERSONNE SÉROPOSITIVE SANS CRAINDRE D'ÊTRE CONTAMINÉ PAR LE VIH.**
Vrai / Faux / Ne sait pas
- 19** **UNE PERSONNE SÉROPOSITIVE OU DÉJÀ MALADE DU SIDA, SOIGNÉE AVEC LES TRAITEMENTS ACTUELLEMENT DISPONIBLES, PEUT VIVRE ET TRAVAILLER.**
Vrai / Faux / Ne sait pas
- 20** **LES PERSONNES SÉROPOSITIVES OU QUI SONT DÉJÀ MALADES DU SIDA DOIVENT RESTER À L'ÉCART DE LA SOCIÉTÉ.**
Vrai / Faux / Ne sait pas



LE SIDA EST UNE MALADIE TRANSMISSIBLE, MAIS NON CONTAGIEUSE.

1 VRAI

VIH signifie le « Virus de l'Immunodéficience Humaine ». Il s'agit du virus qui peut déclencher le SIDA. Le virus peut se transmettre à travers des échanges directs entre deux personnes des fluides corporels suivants : le sang, le sperme et le liquide pré-séminal (le liquide produit par l'homme juste avant l'éjaculation), les sécrétions vaginales, et le lait maternel.

2 VRAI

Seul le stade avancé de l'infection par le VIH s'appelle le SIDA, Syndrome de l'Immuno - Déficience Acquise. En l'absence de traitement, le système immunitaire du corps, c'est-à-dire nos défenses contre les microbes, est de plus en plus affaibli par le VIH de sorte que l'organisme devient très vulnérable aux infections en tout genre et à certaines maladies graves, qui sont caractéristiques du SIDA.

3 VRAI

Quand le VIH est dans le corps, il infecte certaines cellules du sang indispensables au corps pour lutter contre les maladies. Une personne infectée par le VIH, le virus qui cause le SIDA, est dite séropositive. Une personne peut être séropositive sans aucun symptôme apparent. Seul le stade avancé de l'infection par le VIH, caractérisé par l'apparition de nombreuses maladies, s'appelle le SIDA (Syndrome de l'Immuno-Déficience Acquise).

4 FAUX

Il existe trois modes de contamination par le VIH, le virus qui cause le SIDA :

- Les rapports sexuels avec pénétration vaginale, anale ou buccale non protégés par l'utilisation d'un préservatif
- Les échanges sanguins, notamment par l'intermédiaire d'une seringue (partage de matériel d'injection en cas d'usage de drogues, piqûre accidentelle chez un professionnel de santé)
- La transmission de la mère à l'enfant pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement au sein.

5 VRAI

Les rapports sexuels avec pénétration vaginale, anale ou buccale non protégés par l'utilisation d'un préservatif constituent le mode de transmission le plus fréquent.

6 FAUX

On peut toucher et embrasser une personne séropositive, vivre et travailler avec elle sans aucun risque. Le VIH ne se transmet pas par les larmes, la transpiration, la salive ou la toux.

7 FAUX

On ne peut pas être contaminé par le VIH, le virus qui cause le SIDA, en étant piqué par un moustique ou un autre insecte.

8 VRAI

Le VIH peut se transmettre par le sang lorsqu'on utilise des seringues, des aiguilles ou des lames qui sont souillées par le sang d'une personne séropositive. Les professionnels de santé doivent toujours utiliser des seringues et des aiguilles à usage unique. Les professionnels qui réalisent des piercings ou des tatouages doivent aussi utiliser des aiguilles à usage unique. Ceux qui utilisent des rasoirs ne doivent pas réutiliser les mêmes lames avec plusieurs clients. Les personnes qui s'injectent de la drogue ne doivent pas partager leurs seringues et leur matériel d'injection. Dans certains pays la transfusion de sang présente encore un risque.

9 FAUX

Non, il est impossible d'être infecté par le VIH en touchant une personne séropositive. On ne peut pas être infecté par le VIH en partageant le lit, les toilettes, la douche ou en général la maison d'une personne séropositive.

10 VRAI

Le VIH peut se transmettre d'une mère séropositive à son enfant, pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement au sein. Un traitement approprié à base de médicaments appelés antirétroviraux peut permettre d'éviter la transmission du VIH dans 98% des cas. Il est important que la mère séropositive soit dépistée avant sa grossesse ou en début de grossesse pour que le traitement soit prescrit au bon moment et soit le plus efficace possible.

11 VRAI

L'utilisation de préservatifs pendant un rapport sexuel protège contre le risque d'être contaminé par le VIH, le virus qui cause le SIDA.

12 FAUX

Il existe des préservatifs féminins. Il est nécessaire de se protéger par l'utilisation correcte de préservatifs masculins ou féminins.

13 VRAI

Un test de dépistage du VIH est l'unique solution pour savoir si l'on est séropositif. Ces tests sont très fiables mais ils doivent être effectués suffisamment longtemps après une possible contamination, normalement 6 semaines.

14 VRAI

Le test le plus courant est réalisé à partir d'une simple prise de sang. De nombreux pays ont mis en place des centres de dépistages anonymes et gratuits. Dans certains pays il existe aussi des tests fiables à partir de la salive. Pour les personnes qui sont les plus exposées au risque de contamination par le VIH, plusieurs pays recommandent d'effectuer régulièrement le test de dépistage pour vérifier son statut VIH.

15 FAUX

On ne guérit toujours pas du SIDA. Les traitements qui combattent le VIH, appelés traitements antirétroviraux, empêchent le virus de se multiplier et réduisent l'apparition de maladies, ralentissant ainsi le passage au SIDA.

16 VRAI

Si une femme séropositive décide d'avoir un enfant, un médecin pourra lui fournir toutes les informations concernant les traitements qui permettent de réduire les risques de transmission du VIH à l'enfant, le virus qui cause le SIDA. Ce risque peut désormais être réduit significativement à 98%.

17 FAUX

Attention, même si elle suit un traitement, une personne séropositive peut encore transmettre le VIH à une autre personne si elle ne prend pas les précautions nécessaires.

18 VRAI

Il est impossible d'être contaminé par le VIH en touchant une personne séropositive. On ne peut pas être contaminé par le VIH en partageant le lit, les toilettes, la douche ou en général la maison d'une personne séropositive.

19 VRAI

Il est possible de vivre avec le VIH et de continuer à mener une vie professionnelle et sociale.

20 FAUX

Il est important de respecter les personnes séropositives et de leur apporter soutien psychologique et écoute. Il est important de ne pas rester seul quand on est séropositif. Il existe des associations qui peuvent apporter des informations et un soutien. Il est également nécessaire de se faire suivre régulièrement par des services de santé compétents dans le domaine du VIH / SIDA.



**LE SIDA EST UNE MALADIE
TRANSMISSIBLE, MAIS NON
CONTAGIEUSE.**